

FRONT PANEL

Kill-All LIQUID

Reg. No: **L7163** Act/Wet No 36 of/van 1947

**LIQUID RAT AND MOUSE BAIT
ROT EN MUIS VLOEISTOF LOKAAS**

**FOR SALE TO AND USE BY REGISTERED PEST CONTROL OPERATORS ONLY.
SLEGS VIR VERKOOP AAN EN GEBRUIK DEUR GEREGISTREERDE
PLAAGBEHEEROPERATEURS**

For the control of Norway rat (*Rattus norvegicus*),
roof rat (*Rattus rattus*) and the house mouse (*Mus musculus*).
Vir die beheer van Norweegse rot (*Rattus norvegicus*),
dakrot (*Rattus rattus*) en die huismuis (*Mus musculus*).

Active ingredient:
Aktiewe bestanddeel:
Brodifacoum (anticoagulant)....0,5 g/l
Brodifakum (antikoagulant)0,5 g/l

REGISTRATION HOLDER / REGISTRASIEHOUER:

Almond Agro Chemicals (Pty) Ltd / (Edms) Bpk
Reg. No. 1997/006442/07
P.O.Box / Posbus 188,
Van Riebeeck Park, 1629

Lot No.:
Expiry date / Verval datum:

200 ml / 1 l

**VERY TOXIC
UITERS GIFTIG**

[Red colour band]

SYPANEEL

WAARSKUWINGS: Hanteer uiters versigtig. Hou buite die bereik van kinders, oningeligte persone en diere. Bewaar weg van voedsel en voer. Giftig indien ingesluk en by langdurige velkontak. Giftig vir visse, voëls en diere. In geval van vergiftiging ontbied 'n dokter en stel hierdie etiket tot sy beskikking.

VOORSORGMAATREËLS: Vermy enige kontak met die mond. Vermy besoedeling van enige eetbare produkte, voer, eetgerei en drinkwater. Plaas lokaas buite bereik van kinders en troeteldiere. Dra rubberhandskoene en was hande na hantering. Moet nie eet, drink of rook terwyl lokaas hanteer word nie. Spoel leë houer drie keer uit met 'n volume gelykstaande aan 'n minimum van 10 % van die houer. Vernietig leë houer en moet dit vir geen ander doel gebruik nie. Begrawe enige lokaasvloeistof wat nie opgebruik is nie aan die einde van die behandeling en verbrand of begrawe dooie knaagdiere.

SIMPTOME VAN VERGIFTIGING: Bloeding van die tandvleise en neus, onderhuidse bloeding, bleekheid, swelling en teerheid rondom die elmboog- en kniegewrigte. Bloed in urine en ontlasting, en abdominale pyn mag voorkom.

EERSTE HULP BEHANDELING: Verwyder pasiënt van die bron van vergiftiging en hou hom kalm en gerusgesteld. Neem pasiënt ONMIDDELLIK na die naaste geneesheer. Moet nooit enigiets per mond aan 'n bewustelose persoon gee nie en moet nie braking induseer nie.

NOTA AAN GENEESHEER: Dien 5 mg/kg Vit. K₁ intraveneus toe op die eerste dag, gevolg deur 'n addisionele toediening van dieselfde dosis indien die protrombiene tyd nie normaliseer binne 'n paar uur na die eerste inspuiting nie. Volg op met 5 mg/kg/dag mondelings op die tweede en daaropvolgende dae. Die duur van die behandeling is gewoonlik tussen 10 en 15 dae. In ernstige gevalle gee klein oortappings vars bloed.

GEBRUIKAANWYSINGS: Gebruik slegs soos aangedui.

Vir gebruik in huise, op plase en industriële persele. Meng een deel **Kill-All Liquid** met 20 dele water (50 ml op 1 l water) en plaas in houers op strategiese plekke buite bereik van kinders en huisdiere in die gebied waar muise en rotte is. Plaas houers uit met 10 m intervalle vir rotte en 2 m vir muise.

Gaan lokaaspunte daaglik na vir die eerste week en daarna weekliks. Vul lokaas aan waar nodig.