

FRONT PANEL

Kill-All Wedges

Reg. No. L7265 Act/Wet No 36/1947

**RAT AND MOUSE DEADLY WEDGES
ROT EN MUIS DODELIKE WIGGIES**

A ready for use bait block for the control of the Norway rat (*Rattus norvegicus*),
roof rat (*Rattus rattus*) and the house mouse (*Mus musculus*).
'n Gereed vir gebruik lokaasblok vir die beheer van Norweegse rot (*Rattus norvegicus*),
dakrot (*Rattus rattus*) en die huismuis (*Mus musculus*).

Active ingredient:
Aktiewe bestanddeel:
Brodifacoum (anticoagulant)....0,05 g/kg
Brodifakoum (antikoagulant)....0,05 g/kg

REGISTRATION HOLDER/REGISTRASIEHOUER:

Almond Agro Chemicals (Pty) Ltd/(Edms) Bpk
Reg. No. 1997/006442/07
P.O.Box/Posbus 188,
Van Riebeeck Park, 1629

10 / 20 x 8.5g wedges/wiggies /
500 g bucket with wedges/ emmer met wiggies

Lot No.:
Expiry date/Verval datum:

HARMFUL / SKADELIK

[Yellow colour band]

SYSPANEEL

WAARSKUWINGS

- **Hanteer versigtig.**
- Giftig indien ingesluk en met langdurige velkontak.
- Giftig vir visse, voëls en diere.
- Bewaar ongebruikte produk weg van voedsel en voer.
- **HOU BUITE BEREIK VAN KINDERS, ONINGELIGTE PERSONE EN DIERE.**

VOORSORGMAATREËLS

- Was hande goed met seep en water na hantering.
- Vermoed besoedeling van enige water, kos, eetgerei en voer.
- Plaas wiggies in plekke buite bereik van kinders, troeteldiere, huisdiere en wild.
- Vernietig leë houers en moet dit vir geen ander doel gebruik nie.
- Begrawe alle dooie knaagdiere en enige lokaas wat oorbly na beëindiging van die behandeling.
- **Kill-All Wedges** – dooie knaagdiere is potensieel toksies wanneer geëet word deur troeteldiere; kontak 'n veearts dadelik indien kontaminasie voorkom.

SIMPTOME VAN VERGIFTIGING:

- Bloeding van die tandvleise en neus, onderhuidse bloeding, bleekheid, swelling en teerheid rondom die elmboog- en kniegewrigte.
- Bloed in urine en ontlasting, en abdominale pyn mag voorkom.

EERSTE HULP BEHANDELING:

- Verwyder pasiënt van die bron van vergiftiging en hou hom kalm en gerusgesteld.
- Neem pasiënt ONMIDDELLIK na die naaste geneesheer.
- Moet nooit enigiets per mond aan 'n bewustelose persoon gee nie en moet nie braking induseer nie.

NOTA AAN GENEESHEER:

Dien 5 mg/kg Vit. K₁ intraveneus toe op die eerste dag, gevolg deur 'n addisionele toediening van dieselfde dosis indien die protrombine tyd nie normaliseer binne 'n paar uur na die eerste inspuiting nie. Volg op met 5 mg/kg/dag mondelings op die tweede en daaropvolgende dae. Die duur van die behandeling is gewoonlik tussen 10 en 15 dae. In ernstige gevalle gee klein oortappings vars bloed.

GEBRUIKSAANWYSINGS: Gebruik slegs soos aangedui.

Rotte en muise kan 'n dodelike dosis in een voeding inneem, en dooie knaagdiere kom voor na vier tot twaalf dae na behandeling begin is.

- Plaas wiggies in dakke en ander areas, buite bereik van kinders en diere, waar daar tekens is van rotte. Vermoed onnodige kontak met die wiggies.
- In geval van erge infestasië kan meer as een **Kill-All Wedges** gebruik word.